Liste annotée des oiseaux de Lanaudière

Luc Foisy et Martin Tremblay



© Barbara Marsolais



© Martin Tremblay



© Denis Allard

SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE LANAUDIÈRE

Version 2025.2

Table des matières

Pour atteindre directement un des items de la table des matières, cliquez sur le lien hypertexte correspondant ci-dessous.

- PROLOGUE
  - Morphologie de l'oiseau
  - Les âges et les plumages de l'oiseau
  - La carte de répartition d'une espèce
  - Les statuts des oiseaux observés dans Lanaudière
  - Le statut « espèce nicheuse de Lanaudière »
  - Constance d'observation et classe des espèces
  - Les types de présence des espèces dans Lanaudière
  - Un portrait chiffré des oiseaux : période de référence
  - Contenu d'une fiche
- LISTE ANNOTÉE des oiseaux de Lanaudière au 31 décembre 2025 (**les espèces *d'origine incertaine* ou *captive* sont exclues**), les espèces étant classées et nommées selon l'ordre taxonomique et la nomenclature « français (AOU) » proposés par l'*American Ornithological Society* (AOS) et adoptés par le Regroupement QuébecOiseaux (RQO)

Page couverture : *Mésange à tête noire*, photo de Barbara Marsolais; *Pygargue à tête blanche*, photo de Martin Tremblay; *Paruline à croupion jaune*, photo de Denis Allard


Liste des familles dans Lanaudière

La liste des familles selon l'ordre taxonomique de l'AOS au 31 décembre 2025


Anatidae
Odontophoridae
Phasianidae
Podocipetidae
Columbidae
Cuculidae
Caprimulgidae
Apodidae
Trochilidae
Gruidae
Rallidae
Recurvirostridae
Charadriidae
Scolopacidae
Stercorariidae
Alcidae
Laridae
Graviidae
Threskiornithidae
Sulidae
Phalacrocoracidae
Pelecanidae
Ardeidae
Cathartidae
Pandionidae
Accipitridae
Tytonidae
Strigidae
Alcedinidae
Picidae
Falconidae
Tyrannidae
Vireonidae
Laniidae
Corvidae
Paridae
Alaudidae
Hirundinidae
Regulidae
Bombycillidae
Sittidae
Certhiidae
Polioptilidae
Troglodytidae
Mimidae
Sturnidae
Turdidae
Passeridae
Motacillidae
Fringillidae
Calcariidae
Passerellidae
Icteriidae
Icteridae
Parulidae
Cardinalidae


Pour vous rendre directement à une famille, cliquez sur le terme correspondant. Vous pouvez retourner à cette page « Liste des familles » à partir de chaque diapositive du diaporama qui annonce une nouvelle famille.


Morphologie de l'oiseau













Les plumes des ailes : les rémiges

Les ailes comportent un **bord d'attaque** et un **bord de fuite** ainsi que trois grandes catégories de plumes, les **rémiges**.

- Les **rémiges primaires** sont fixées sur la main. Ce sont les plumes sur lesquelles s'exercent les principales poussées pour le vol.
- Les **rémiges secondaires** sont fixées sur l'avant-bras (os ulna). Elles servent à la portance de l'oiseau.
- Les **rémiges tertiaires** sont fixées à l'humérus. Ce sont des plumes plus petites qui, avec leur couverture, recouvrent les épaules et une partie du dos.

LES PLUMES DE LA QUEUE : LES RECTRICES










Morphologie de l’oiseau



Les âges et les plumages des oiseaux

Un oiseau nait nu et acquiert plusieurs plumages successifs. On peut l'observer dans chacun de ses plumages, mais aussi en période de mue, lorsqu'il passe d'un plumage à un autre.

- Le terme "**oisillon**" s'applique à l'oiseau, de sa sortie de l'œuf jusqu'à l'acquisition de son plumage juvénile.
- Le terme "**juvénile**" s'applique à l'oiseau tant qu'il conserve son premier plumage acquis au nid. C'est le premier plumage immature. Le plumage juvénile dure très peu de temps chez la plupart des passereaux, mais persiste plus longtemps chez les rapaces, les goélands, les limicoles et d'autres espèces.
- Le terme "**immature**" s'applique à l'oiseau dans son plumage juvénile (considéré comme le premier plumage immature) et dans tous ses plumages subséquents jusqu'à l'acquisition de son plumage adulte définitif.
- Le terme "**adulte**" fait référence au plumage de l'oiseau et non pas au moment où l'oiseau a atteint l'âge de se reproduire. Il s'applique à l'oiseau lorsqu'il acquiert son plumage définitif qui sera répété tout le restant de sa vie.


Oisillon


Juvénile


Immature


Adulte


La carte de répartition des espèces

L’aire de résidence permanente. L'espèce est présente en toutes saisons.

L’aire de nidification. L'espèce arrive au printemps, y passe l'été et repart à l'automne pour son aire d'hivernage.

L’aire de migration. L'espèce y passe au printemps lorsqu'elle va de son aire d'hivernage à son aire de nidification et à l'automne lorsqu'elle passe de son aire de nidification à son aire d'hivernage.

L’aire d’hivernage. L'espèce, arrivée au cours de l'automne, y passe l'hiver et retourne à son aire de nidification au cours du printemps.



La carte de répartition des espèces

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone rose-lilas de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible toute l'année.

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone rose-orangé de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps et à l'automne. Les premiers restent dans Lanaudière pour y nicher, les seconds ne font que traverser notre région, sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone jaune crème de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps et à l'automne. Les individus de l'espèce ne font que traverser notre région sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone bleu turquoise de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* dont la présence est prévisible tard à l'automne, à l'hiver et au début du printemps et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible à l'automne et au printemps. Les premiers viennent dans Lanaudière pour y passer l'hiver, les seconds ne font que traverser notre région, sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.


Statuts des oiseaux dans Lanaudière














Lorsqu'on observe un oiseau dans Lanaudière, on peut lui rattacher un « statut » qui est lié à son type de présence dans la région, aux saisons où on peut l'observer.

Ces statuts se rapportent aux 6 situations suivantes…

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Nicheur résidant : L'oiseau niche dans Lanaudière et y réside à l'année. On peut donc l'observer tout au long de l'année. Sa présence est prévisible en toutes saisons : au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver.






Trois Geais bleus ont été observés le 14 juillet 2017 dans les sentiers de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha par B. Cloutier et J. Arsenault. Ces individus, observés à l'été, étaient fort probablement des *nicheurs résidants*.

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Nicheur migrateur : l'oiseau niche dans Lanaudière, mais il quitte pour le sud lors de sa migration d'automne et revient lors de sa migration printanière. On peut donc l'observer au printemps après son retour, à l'été et à l'automne avant qu'il reparte. Sa présence est prévisible trois saisons : au printemps, à l'été et à l'automne.






Huit Parulines jaunes ont été notées le 3 juillet 2016 à Berthier à l'Île du Milieu par G. Cossette et L. Turcotte. Ces individus, observés à l'été, étaient fort probablement des *nicheurs migrateurs*.

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Migrateur de passage : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il fait halte dans notre région lors de son passage entre son aire de nidification et son aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière. Sa présence est prévisible deux saisons : au printemps et à l'automne.






40 000 Oies des neiges ont été notées à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy le 20 avril 2017 par Y. Gauthier. Ces individus, observés au printemps, étaient fort probablement des *migrateurs de passage*.

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Hivernant : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il n'y vient que pour l'hiver : il arrive généralement tard à l'automne, passe l'hiver et retourne tôt au printemps. Sa présence est donc prévisible trois saisons : tard à l'automne, à l'hiver et tôt au printemps.






Cinq Harfangs des neiges ont été notés dans la plaine de Saint-Barthélemy le 13 février 2016 par R. Piché, J. P. Guilbault et J. Piché. Ces individus, observés à l'hiver, étaient fort probablement des *hivernants*.

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Visiteur : l'oiseau ne vient dans Lanaudière qu'accidentellement, entraîné hors de l'aire qu'il occupe habituellement par suite de divers phénomènes de dispersion : erratisme, déplacements hors des voies habituelles de migration, dispersion prénuptiale ou postnuptiale, incursions subites. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.






Une Avocette d'Amérique a été notée à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy le 4 mai 2001 par M. Lebel et G. Pauzé. Cet individu, observé au printemps, était certainement un *visiteur*.

Statuts des oiseaux dans Lanaudière

Origine indéterminée (ou Origine *incertaine* ou *Origine captive* ou *Visiteur exotique*) : l'oiseau est relâché dans la nature ou échappé accidentellement de captivité, non acclimaté, mais a peut-être niché à une ou plusieurs reprises au Québec. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.






Un Chardonneret élégant a été noté le 5 mai 2008 à Sainte-Marie-Salomé par P. Boissonneault. Cet individu, observé au printemps, était certainement un oiseau d'*origine indéterminée*.

Le statut « espèce nicheuse de Lanaudière »

Espèce nicheuse

La SOL attribue le statut *espèce nicheuse de Lanaudière* à toute espèce dont au moins un couple a réussi une nidification à l'intérieur des limites de la région. Un processus rigoureux présenté dans le livre "Foisy, L. et M. Harnois. (2020). *Les espèces nicheuses de Lanaudière*. Société d'ornithologie de Lanaudière. 2020. vi + 218 pages" permet de conclure que, avant le 31 mars 2018, 181 espèces répondaient au statut d'*espèces nicheuses de Lanaudière.*

Au 31 décembre 2025, on en compte 182 espèces.



La constance d'observation d'une espèce

La constance d'observation d'une espèce pour une période donnée s'exprime mathématiquement en pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport au nombre total de feuillets traités pour la période.

$$CO_{période} = \frac{nombre\ de\ feuillets\ où\ l'espèce\ est\ mentionnée}{nombre\ total\ de\ feuillets\ pour\ la\ période} \times 100$$


Plus la constance d'observation d'une espèce est élevée, plus grandes sont les chances de l'observer. Selon la valeur de la constance d'observation, l'espèce se situe, pour la période considérée, dans l'une des sept classes suivantes.

Classe de l'espèce selon la valeur de la constance d'observation		
31 % ≤	Assidue (A)	
15 % ≤	Commune (C)	< 31 %
7 % ≤	Fréquente (F)	< 15 %
3 % ≤	Occasionnelle (O)	< 7 %
1 % ≤	Rare (R)	< 3 %
0 % <	Inusitée (I)	< 1 %
	Exceptionnelle (E)	0 %

La constance d'observation d'une espèce

La période de référence pour la détermination des constances d'observation saisonnières des espèces de la LISTE ANNOTÉE DES OISEAUX DE LANAUDIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 est **une période de 40 ans** comprise entre le 1er mars 1984 et le 29 février 2024. Cette période de référence de 40 ans comporte 40 printemps, 40 étés, 40 automnes et 40 hivers. L'analyse porte sur **119 820** feuillets enregistrés pendant cette période. Ces feuillets comportent **1 371 807** mentions.

On a défini quatre **constances d'observation saisonnières,** une pour les 40 printemps de cette période de 40 ans (COP), une pour les 40 étés de cette période de 40 ans (COE), une pour les 40 automnes de cette période de 40 ans (COA), une pour les 40 hivers de cette période de 40 ans (COH).



- **COP : Constance d'Observation Printanière.** La COP donne le pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport aux 43 975 feuillets traités pendant les 40 printemps (du 1er mars au 31 mai) entre le 1er mars 1984 et le 31 mai 2023.
- **COE : Constance d'Observation Estivale.** La COE donne le pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport aux 16 088 feuillets traités pendant les 40 étés (du 1er juin au 31 juillet) entre le 1er juin 1984 et le 31 juillet 2023
- **COA : Constance d'Observation Automnale.** La COA donne le pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport aux 26 168 feuillets traités pendant les 40 automnes (du 1er août au 30 novembre) entre le 1er août 1984 et le 30 novembre 2023.
- **COH : Constance d'Observation Hivernale.** La COH donne le pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport aux 31 589 feuillets traités pendant les 40 hivers (du 1er décembre au 28 (ou 29) février de l'année qui suit) entre le 1er décembre 1984 et le 29 février 2024.

Les types de présence d'une espèce dans Lanaudière

C'est le caractère cyclique de la vie des oiseaux qui nous permet de prévoir les saisons où une espèce peut être présente dans Lanaudière.

On peut alors regrouper les espèces en cinq catégories, selon leur type de présence dans Lanaudière, les saisons où leur présence est prévisible. Ainsi, on a les espèces dont la présence est ...

- prévisible en toutes saisons : printemps, été, automne et hiver (PÉAH);
- prévisible trois saisons : printemps, été et automne; imprévisible à l'hiver (PÉA);
- prévisible trois saisons : automne, hiver et printemps; imprévisible à l'été (AHP);
- prévisible deux saisons : printemps et automne; imprévisible à l'été et à l'hiver (PA);
- imprévisible en toutes saisons (IMP).

Les types de présence d'une espèce dans Lanaudière

Nombre d'espèces au 31 décembre 2025 dans les cinq catégories liées à leur type de présence dans Lanaudière (**les espèces *d'origine incertaine* ou *captive* sont exclues**)

CATÉGORIES	Nombre d'espèces
Présence prévisible en toutes saisons (PÉAH)	55
Présence prévisible trois saisons : printemps, été et automne, imprévisible à l'hiver (PÉA)	119
Présence prévisible trois saisons : automne, hiver et printemps; imprévisible à l'été (AHP)	15
Présence prévisible deux saisons : printemps et automne; imprévisible à l'été et à l'hiver (PA)	36
Présence imprévisible en toutes saisons (IMP)	108
TOTAL	333

Les chiffres du tableau ci-dessus ne peuvent cependant être considérés comme définitifs car les espèces peuvent étendre leur territoire, ou en abandonner. Les statuts peuvent changer. De nouvelles informations vont s'ajouter, confirmant ou changeant le portrait d'une espèce dans Lanaudière.

Ce tableau constitue notre meilleure estimation, aujourd'hui, à partir des informations obtenues avant le 1er janvier 2026, d'un portrait changeant de la présence des espèces dans Lanaudière.

Un portrait chiffré des oiseaux

La période de référence pour notre portrait des oiseaux dans Lanaudière est celle de 40 années de la SOL, entre le 1er mars 1984 et le 29 février 2024, pendant laquelle des ornithologues de Lanaudière ou de d'autres régions ont parcouru les différents habitats de Lanaudière.

L'analyse porte sur 119 820 listes d'observations enregistrées pendant cette période dans la base de données eBird. Ces feuillets comportent 1 371 807 mentions et rapportent **325** espèces différentes. Puisque le total des espèces notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026 est de **333**, cela signifie qu'il y a **8** espèces* qui ont été notées **avant** le 1er mars 1984 **ou après** le 29 février 2024**, mais qui n'ont pas été notées** pendant la période de référence de 40 ans, entre le 1er mars 1984 et le 29 février 2024.

***5 espèces notées AVANT le 1er mars 1984 et non notées pendant la période de référence**
L'Aigrette tricolore, le Bruant noir et blanc, l'Effraie d'Amérique, le Guiraca bleu, la Paruline orangée.


***3 espèces notée APRÈS le 29 février 2024 et non notées pendant la période de référence**
Le Bécasseau violet, l'Échasse d'Amérique, le Tohi tacheté.


Contenu d'une fiche

Canard branchu (Aix sponsa) 1

2 Anatidae

5 Espèce nicheuse





6

COP	COE	COA	COH
8,86	8,42	10,7	0,256

7 **PÉA**

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. 8

Contenu d'une fiche

Chaque fiche est associée à une espèce et comporte les renseignements suivants :

1. Le nom français de l'espèce (*le nom latin de l'espèce*).
2. Le nom latin de la famille à laquelle appartient l'espèce.
3. Une photo de l'espèce (ou deux photos dans certains cas). C'est généralement l'oiseau dans son plumage le plus distinctif.
4. La carte de répartition de l'espèce.
5. Le statut « espèce nicheuse de Lanaudière » s'il y a lieu.
6. Les valeurs des constances d'observation saisonnières (COP, COE, COA, COH) pour la période de 40 ans entre le 1er mars 1984 et le 29 février 2024. Cette période de référence rapporte les observations contenues dans 119 820 feuillets d'observations quotidiennes comportant 1 371 807 mentions.
7. La catégorie (PÉAH, PÉA, AHP, PA, IMP) indiquant le type de présence de l'espèce dans Lanaudière.
8. Une description de la présence de l'espèce en termes de statuts les plus probables des individus observés et du caractère prévisible ou imprévisible de leur présence à chaque saison.

Les espèces d’origine incertaine ou captive

Certaines espèces dont la présence est **imprévisible** dans Lanaudière sont des espèces ***d’origine incertaine*** ou ***captive***.

Le Regroupement QuébecOiseaux **exclut** ces espèces de **SA LISTE DES OISEAUX**. À la SOL nous avons décidé de suivre leur exemple.

Pour cette raison, les **espèces considérées comme étant d’*origine incertaine* ou *captive*** observées dans Lanaudière **ne font pas partie** de cette LISTE ANNOTÉE DES OISEAUX DE LANAUDIÈRE.

Liste annotée des oiseaux de Lanaudière

Luc Foisy et Martin Tremblay



© Barbara Marsolais



© Martin Tremblay



© Denis Allard


SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE LANAUDIÈRE

Version 2025.2

Liste des 333 espèces observées dans Lanaudière (les espèces *d'origine incertaine* ou *captive* sont exclues) avant le 1er janvier 2026, les espèces étant classées et nommées selon **l'ordre taxonomique** et **la nomenclature « français (AOU) »** proposés par l'American Ornithological Society (AOS) et adoptés par le Regroupement QuébecOiseaux (RQO).

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Zones géographiques




Les six MRC de Lanaudière



LES *ANATIDAE*

(Les canards et ceux qui leur ressemblent)



46 espèces d'*Anatidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Dendrocygne à ventre noir (*Dendrocygna automnalis*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,740	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 6 juin 1993, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Oie des neiges (*Anser caerulescens*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
9,39	1,60	1,05	0,165


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Oie de Ross (Anser rossii)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0.248	0	0,007	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 11 avril 1998, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Oie cendrée (Anser anser)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



© Pierre Bannon



Aire de nidification
Aire de migration
Aire de résidence permanente
Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
0,009	0	0	0,006

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 1996, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Oie rieuse (Anser albifrons)

Anatidae

Espèce

non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0.146	0	0,089	0,019

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 30 avril 1983, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Oie à bec court (Anser brachyrhynchus)

Anatidae

Espèce

non-nicheuse





Aire de nidification

Aire de migration

Aire de résidence permanente

Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 12 avril 2025, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bernache cravant (*Branta bernicla*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0.225	0,081	0,082	0




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bernache nonette (*Branta leucopsis*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,011	0	0,007	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 3 novembre 2002, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bernache de Hutchins (*Branta hutchinsii*)


Anatidae

Espèce

non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,157	0	0,099	0,041




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 octobre 1991, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
38,4	19,3	28,3	5,23

PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.


Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)


Anatidae

Espèce

non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,070	0,622	0,007	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 4 avril 1987, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Cygne trompette (*Cygnus buccinator*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,084	0	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 9 avril 2023, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Cygne siffleur (*Cygnus columbianus*)

Anatidae

Espèce

non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,341	0,006	0,039	0,003

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 11 juin 1966, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

Anatidae

Espèce

non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0	0	0

- Aire de nidification
- Aire de migration
- Aire de résidence permanente
- Aire d'hivernage


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 mai 2010, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Canard branchu (Aix sponsa)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,86	8,42	10,7	0,256

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Sarcelle à ailes bleues (*Spatula discors*

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,77	1,88	2,25	0,003

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Sarcelle cannelle (*Spatula cyanoptera*)


Anatidae

Espèce

non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 13 avril 1999, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Canard souchet (*Spatula clypeata*)

Anatidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
8,52	3,66	3,28	0.722



PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Canard chipeau (*Macera strepera*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,20	7,19	4,65	0,184

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Canard siffleur (*Mareca penelope*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,214	0,242	0,025	0,025


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 1980, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Canard d'Amérique (*Mareca amricana*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
7M17	4,88	4,47	0,146


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Anatidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
35,9	28,7	27,8	7,17

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Canard noir (*Anas rubripes*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
11,4	6,47	11,1	3,66

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Canard pilet (*Anas acuta*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
11,9	2,07	1,51	0,155

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

Anatidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
8,09	2,07	7,32	0,285



PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Fuligule à dos blanc (*Aythya vaselineria*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,016	0,012	0,007	0,028



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 1969, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Fuligule à tête rouge (*Aythya americana*)

Anatidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,62	0,416	0,291	0



PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,082	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 mai 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Fuligule à collier (*Aythya collaris*)

Anatidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
10,3	2,59	5,30	0,079




PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,011	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 27 avril 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Fuligule Milouinan (Aythya marila)


Anatidae

Espèce

non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,14	0,037	1,13	0,051



PÉA L'espèce est constituée essentiellement de migrateurs de passage dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Petit Fuligule (*Aythya affinis*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
2,03	0,162	1,73	0,114




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Eider à tête grise (*Somateria spectabilis*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0	0	0,259	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 17 novembre 2016, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Eider à duvet (*Somateria mollissima*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,005	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 24 avril 1984, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*)


Anatidae

Espèce

non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0	0	0,014	0,054


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 7 octobre 1993, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Macreuse à front blanc (*Melanita perspicillata*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,09	0	0,241	0,003


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Macreuse à ailes blanches (*Melanitta deglandi*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,152	0,031	0,596	0,054


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Macreuse à bec jaune (*Melanita americana*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,043	0	0,476	0,019

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Harelde kakawi (*Clangula hyemalis*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,057	0	0,501	0,016




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Petit Garrot (*Bucephala albeola*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,85	0,062	2,16	0,095


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,30	2,83	4,60	1,03

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,025	0	0,004	0,013


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 1er mai 1971, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Harle couronné (*Lophodytes cucullatus*)

Anatidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
6,36	1,51	7,29	0,867

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Grand Harle (*Mergus merganser*)

Anatidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
9,14	4,16	7,53	4,77

PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.


Harle huppé (*Mergus serrator*)

Anatidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,405	0,012	0,376	0,085



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)

Anatidae

Espèce

non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,143	0,031	0,099	0,073

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

LES *PHASIANIDAE*

(les dindons, les tétras, les perdrix, …)



6 espèces de *Phasianidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Dindon sauvage (*Meleagris gallopavo*)

Phasianidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,08	0,951	0,934	2,01




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Gélinotte huppée (*Bonasa umbellus*)

Phasianidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,25	4,47	4,62	2,59

PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Tétras du Canada (*Canachites canadensis*)

Phasianidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,052	0,174	0,366	0,066



PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Lagopède des saules (*Lagopus lagopus*)


Phasianidae

Espèce non-nicheuse



© Daniel Jauvin





COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 28 novembre 2021, l'espèce est constituée essentiellement de visiteurs dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Tétras à queue fine (Tympanuchus phasianellus)

Phasianidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 18 mai 1996, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Perdrix grise (*Perdix perdix*)

Phasianidae

Espèce nicheuse



© Martin Tremblay




COP	COE	COA	COH
0,539	0,149	0,256	1,51

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *PODOCIPEDIDAE*

(les grèbes)



3 espèces de *Podocipedidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Grèbe à bec bigarré (*Podilymbus podiceps*)

Podocipedidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,72	7,44	6,05	0,006

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

Podocipedidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,052	0,006	0,220	0,009




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

Podocipedidae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,175	0M087	1,16	0,019

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

LES *COLUMBIDAE*

(les pigeons, les colombes, les tourterelles, …)



4 espèces de *Columbidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles

Tourterelle à ailes blanches (*Zenaida asiatica*)

Columbidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,044	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 13 juin 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Tourterelle triste (*Zenaida macroura*)

Columbidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
29,9	28,2	24,4	28,5




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

Columbidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,006	0,007	0,013

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 novembre 2013, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Pigeon biset (Columba livia)

Columbidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
14,9	10,5	12,2	20,7

PÉAH L'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *CUCULIDAE*

(les coulicous)



2 espèces de *Cuculidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus)

Cuculidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0,019	0,036	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 mai 1999, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Coulicou à bec noir (Coccyzus erythropthalmus)

Cuculidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,211	1,85	0,089	0



PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de nicheurs migrateurs et de migrateurs de passage dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *CAPRIMULGIDAE*

(les engoulevents)



2 espèces de *Caprimulgidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Engoulevent d'Amérique (*Chordeiles minor*)

Caprimulgidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,148	0,833	0,589	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Engoulevent bois-pourri (*Antrostomus vociferus*)

Caprimulgidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,389	0,814	0,114	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *APODIDAE*

(les martinets)



1 espèce d'*Apodidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Martinet ramoneur (*Chaetura pelagica*)

Apodidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,71	7,25	1,09	0



PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *TROCHILIDAE*

(les colibris)



2 espèces de *Trochilidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Colibri à gorge rubis (*Archilochus colubris*)

Trochilidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,13	17,6	8,10	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Colibri roux (*Selasphorus rufus*)

Trochilidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,060	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 septembre 1996, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *GRUIDAE*

(les grues)



1 espèce de *Gruidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles


Grue du Canada (Antigone canadensis)

Gruidae

Espèce nicheuse








COP	COE	COA	COH
0,523	0,342	0,359	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de nicheurs migrateurs et de migrateurs de passage dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *RALLIDAE*

(les râles, les gallinules, les foulques…)



4 espèces de *Rallidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Râle de Virginie (*Rallus limicola*)

Rallidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,29	2,72	0,543	0




PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Marouette de Caroline (*Porzana carolina*)

Rallidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,630	1,16	0,131	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Gallinule d'Amérique (*Gallinula geleata*)

Rallidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,42	5,89	4,40	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Foulque d'Amérique (*Fulica americana*)

Rallidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,500	1,03	1,16	0,009




PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *RECURVIROSTRIDAE*

(les échasses et les avocettes)



2 espèces de *Recurvirostridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Échasse d'Amérique (*Himantopus mexicanus*)

Recurvirostridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 17 mai 2025, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Avocette d'Amérique (*Recurvirostra americana*)

Recurvirostridae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,005	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 mai 2001, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *CHARADRIIDAE*

(les pluviers, les vanneaux…)



6 espèces de *Charadriidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

Charadriidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,430	0,137	0,458	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*)

Charadriidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,061	0	0,138	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Pluvier kildir (*Charadrius vociferius*)

Charadriidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
14,7	11,8	4,21	0,006

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Pluvier semipalmé (*Charadrius semipalmatus*)

Charadriidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,948	0,193	1,15	0

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Pluvier siffleur (*Charadrius melodus*)

Charadriidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,007	0	0	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 27 mai 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

Charadriidae

Espèce non-nicheuse






Aire de nidification
Aire de migration
Aire de résidence permanente
Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
0,189	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 2013, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *SCOLOPACIDAE*

(les bécasseaux, les bécassins, les chevaliers,…)



30 espèces de *Scolopacidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Maubèche des champs (*Bartramia longicauda*)

Scolopacidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,173	0,566	0,025	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Courlis hudsonien (*Numenius hudsonicus*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 septembre 1981, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Barge hudsonienne (*Limosa haemastica*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,020	0	0,202	0




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Barge marbrée (*Limosa fedoa*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,057	0,031	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 18 mai 1970, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Tournepierre à collier (*Arenaria interpres*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,073	0,031	0,025	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,041	0,037	0,060	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Combattant varié (*Calidris pugnax*)



Scolopacidae


Espèce



non-nicheuse



© Daniel Jauvin



Aire de nidification

Aire de migration

Aire de résidence permanente

Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
0,082	0	0,007	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 21 mai 1972, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bécasseau à échasses (*Calidris himantopus*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0,031	0,178	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 24 mai 2003, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,007	0	0,078	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 11 septembre 1976, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,530	0,075	0,380	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bécasseau violet (*Calidris maritima*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 3 décembre 2025, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*)



Scolopacidae

Espèce




non-nicheuse



© Daniel Jauvin

COP	COE	COA	COH
0	0	0.064	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 3 septembre 1989, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bécasseau minuscule (*Calidris minutilla*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,32	0,559	1,45	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bécasseau à croupion blanc (*Calidris fuscicollis*)


Scolopacidae

Espèce

non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,091	0,062	0,124	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Bécasseau roussâtre (*Calidris subruficollis*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0,006	0,007	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 27 août 1983, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bécasseau à poitrine cendrée (*Calidris melanotos*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,214	0,075	1,30	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Bécasseau semipalmé (*Calidris pusilla*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,389	0,348	1,34	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Bécasseau d'Alaska (*Calidris mauri*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 18 août 1998, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bécassin roux (*Limnodromus griseus*)

Scolopacidae

Espèce

non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,264	0,106	0,220	0

PA


L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,014	0	0,092	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 29 septembre 1991, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bécasse d'Amérique (*Scolopax minor*)

Scolopacidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,40	0,615	0,220	0,003


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bécassine de Wilson (*Gallinago delicata*)

Scolopacidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,77	3,38	2,34	0,003

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Chevalier grivelé (*Actitis macularius*)

Scolopacidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,23	11,1	3,78	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Chevalier solitaire (*Tringa solitaria*)

Scolopacidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,46	0,410	1,78	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Petit Chevalier (*Tringa flavipes*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,33	1,39	4,05	0

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Chevalier semipalmé (*Tringa semipalmata*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,009	0	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 11 juin 1966, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Grand Chevalier (*Tringa melanoleuca*)


Scolopacidae

Espèce

non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
3,43	0,901	3,16	0



PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Phalarope de Wilson (*Phalaropus tricolor*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,084	0,050	0,053	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 mai 1977, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)

Scolopacidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,014	0,186	0,160	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 7 septembre 1969, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *STERCORARIIDAE*

(les labbes)



2 espèces de *Stercorariidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)

Stercorariidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 septembre 2003, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*)


Stercorariidae

Espèce non-nicheuse



© José Gagnon

COP	COE	COA	COH
0	0,012	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 1er juin 1988, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *ALCIDAE*

(les guillemots, les macareux, les pingouins…)



2 espèces d'*Alcidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles


Guillemot de Brünnich (*Uria lomvia*)

Alcidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0	0	0,007	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 novembre 1995, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Petit Pingouin (*Alca torda*)

Alcidae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 novembre 2023, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *LARIDAE*

(les goélands, les mouettes, les sternes, …)



14 espèces de *Laridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)

Laridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,093	0,454	0,547	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Guiffette noire (*Chilidonias niger*)

Laridae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,503	3,10	0,309	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

Laridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,56	6,10	0,735	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)

Laridae

Espèce

non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0	0	0,018	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 27 septembre 1989, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Mouette de Sabine (*Xema sabini*)

Laridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 9 septembre 2020, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Mouette de Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*)

Laridae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,614	0,746	0,611	0




PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Mouette pygmée (*Hydrocoloeus minutus*)

Laridae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,025	0,168	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 12 mai 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Mouette de Franklin (*Leucophaus pipiscan*)

Laridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,027	0,006	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 3 mai 2020, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Goéland à bec cerclé (*Lrus delawarensis*)

Laridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
37,1	38,8	29,3	1,93

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Goéland hudsonien (*Larus smithsoniamus*)

Laridae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
5,96	2,92	5,70	6,40




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Goéland arctique (*Larus glaucoides*)

Laridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,300	0	0,160	1,71

AHP


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Goéland brun (*Larus fuscus*)

Laridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,569	0,037	0,117	0,117


AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)

Laridae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,644	0	0,082	3,38


AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.


Goéland marin (*Larus marinus*)

Laridae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
6,14	1,16	4,51	9,31

AHP

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

LES *GRAVIIDAE*

(les plongeons)



2 espèces de *Graviidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

Gravidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0	0,071	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 24 mai 1987, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Plongeon huard (*Gavia immer*)

Gravidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
3,37	10,3	9,60	0,262




PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *SULIDAE*

(les fous)



1 espèce de *Sulidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Fou de Bassan (*Morus bassanus*)

Sulidae

Espèce

non-nicheuse








COP	COE	COA	COH
0,005	0	0,011	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 octobre 1995, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *PHALACROCORACIDAE*

(les cormorans)



2 espèces de *Phalacrocoracidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Phalacrocoracidae

Espèce non-nicheuse








COP	COE	COA	COH
0	0	0	0,051


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 1er janvier 2013, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Cormoran à aigrettes (*Nannopterum auritum*)

Phalacrocoracidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
5,38	8,60	11,0	0,114

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *THRESKIORNITHIDAE*

(les ibis)




2 espèces de *Threskiornithidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)

Trheskiornithidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,155	0,050	0,060	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 mai 1971, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Ibis à face blanche (*Plegadis chihi*)

Trheskiornithidae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0	0	0,245	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 21 août 2022, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *PELECANIDAE*

(les pélicans)



2 espèces de *Pelecanidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Pélican d'Amérique (*Pelecanus erythrorhynchos*)

Pelicanidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,164	0,186	0,231	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 mai 1992, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Pélican brun (*Pelecanus occidentalis*)

Pelicanidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,021	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 30 septembre 1994, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *ARDEIDAE*

(les hérons, les aigrettes, les bihoreaux, les butors, …)



11 espèces d'*Ardeidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Petit Blongios (*Botaurus exilios*)

Ardeidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,357	2,41	0,912	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Butor d'Amérique (*Botaurus lentiginosus*)

Ardeidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,52	4,25	1,39	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Aigrette bleue (*Egretta caerulea*)

Ardeidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,037	0,121	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 août 1974, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Aigrette tricolore (*Egretta tricolor*)

Ardeidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 23 mai 1966, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Aigrette neigeuse (*Egretta thula*)

Ardeidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,089	0,255	0,004	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 mai 1965, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bihoreau violacé (*Nyctanessa violacea*)

Ardeidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 26 avril 2008, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

Ardeidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,09	8,29	3,23	0,003

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Héron vert (*Butorides virescens*)

Ardeidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,732	2,88	1,53	0M003

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Grande Aigrette (*Ardea alba*)

Ardeidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
2,68	8,01	8,28	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Héron garde-boeufs (*Ardea ibis*)

Ardeidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,052	0,019	0,305	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 août 1960, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Grand Héron (*Ardea herodias*)

Ardeidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
18,1	26,4	23,5	0,804

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *CATHARTIDAE*

(les urubus)



2 espèces de *Cathartidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles

Urubu noir (*Coragyps atratus*)




Cathartidae

Espèce




non-nicheuse



© Marcel Harnois

COP	COE	COA	COH
0,002	0,019	0,021	0





IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 juillet 2010, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Urubu à tête rouge (*Cathartes aura*)

Cathartidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
15,9	17,6	12,7	0,092

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *PANDIONIDAE*

(le balbuzard)



1 espèce de *Pandionidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)


Pandionidae

Espèce nicheuse



© Martin Tremblay





COP	COE	COA	COH
4,79	3,38	4,29	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *ACCIPITRIDAE*

(les rapaces diurnes : les aigles, les buses, les éperviers, …)



12 espèces d'*Accipitridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Naucler à queue fourchue (*Elanoides forficatus*)

Accipitridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 9 septembre 2017, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)

Accipitridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,272	0,019	1,07	0,082

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.


Épervier brun (*Accipiter striatus*)

Accipitridae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,99	1,42	4,22	1,67




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Épervier de Cooper (*Accipiter cooperii*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,59	1,22	1,96	2,55


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Autour d'Amérique (*Accipiter atricapillus*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,500	0,385	1,28	0,503


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Busard des marais (*Circus hudsonius*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





Aire de nidification
Aire de migration
Aire de résidence permanente
Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
8,18	4,49	7,74	0,7172

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Pygargue à tête blanche (*Haliaeetus leucocephalus*)

Accipitridae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
6,99	6,58	8,04	4,99



PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Buse à épaulettes (*Buteo lineatus*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,92	2,67	1,84	0,073

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Petite Buse (*Buteo platypterus*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,49	7,14	2,99	0,003

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Buse de Swainson (*Buteo swainsoni*)

Accipitridae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0,004	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 1er septembre 1853, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Buse à queue rousse (*Buteo jamaicensis*)

Accipitridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,00	2,87	11,3	8,73

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Buse pattue (*Buteo lagopus*)


Accipitridae

Espèce non-nicheuse


© Daniel Jauvin


© Martin Tremblay





COP	COE	COA	COH
7,88	0,050	5,26	9,47

AHP

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

LES *TYTONIDAE*

(les effraies)



1 espèce de *Tytonidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Effraie d'Amérique (*Tyto furcata*)

Tytonidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 novembre 2026, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *STRIGIDAE*

(les hiboux, les chouettes, les nyctales, petits-ducs, …)



10 espèces de *Strigidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles

Petit-duc maculé (*Megascops asio*)

Strigidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,191	0,056	0,202	0,605


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Grand-duc d'Amérique (*Bubo virginianus*)

Strigidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,850	0,317	0,777	0,795


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*)

Strigidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
3,60	0,012	2,08	14,1

AHP


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Chouette épervière (*Surnia ulula*)

Strigidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,059	0,006	0,060	1,81


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Chouette rayée (*Strix varia*)

Strigidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,569	0,516	0,557	0,450


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Chouette lapone (*Strix nebulosa*)

Strigidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,191	0	0,018	0,636


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 24 février 1974, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

Strigidae

Espèce nicheuse








COP	COE	COA	COH
0,043	0,106	0,117	0,127


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Hibou des marais (*Asio flammeus*)

Strigidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,150	0,012	0,138	0,440


AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Nyctale de Tengmalm (*Aegolius funereus*)

Strigidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,025	0	0,004	0,032


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Petite Nyctale (*Aegolius acadicus*)

Strigidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,352	0,131	0,178	0,225

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *ALCEDINIDAE*

(les martins-pêcheurs)




1 espèce de *Alcedinidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Martin-pêcheur d'Amérique (*Megaceryle alcyon*)

Alcedinidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,88	13,0	10,9	0,073

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *PICIDAE*

(les pics)



9 espèces de *Picidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Pic à tête rouge (*Melanerpes erythrocephalus*)

Picidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,020	0,106	0	0,006




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 21 juin 1980, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Pic à ventre roux (*Melanerpes carolinus*)

Picidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,150	0,025	0,550	0,494


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 novembre 1993, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Pic maculé (*Sphyrapicus varius*)

Picidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
6,78	9,60	3,47	0,022

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Pic à dos rayé (*Picoides dorsalis*)

Picidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,018	0,031	0,046	0,079

PÉAH Notée pour la première fois dans Lanaudière le 4 janvier 1963, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Pic à dos noir (*Picoides arcticus*)

Picidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,307	0,423	0,522	0,595




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Pic mineur (*dryobates pubescens*)

Picidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
26,9	18,3	25,1	28,1


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Pic chevelu (*Dryobates villosus*)

Picidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
16,9	12,5	18,9	22,4

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Pic flamboyant (*Colaptes auratus*)

Picidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
22,5	30,1	14,8	0,364



PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Grand Pic (*Dryocopus pileatus*)

Picidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
6,25	5,40	6,34	5,12



PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *FALCONIDAE*

(les faucons)



4 espèces de *Falconidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Crécerelle d'Amérique (*Falco sparverius*)

Falconidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,93	3,84	3,31	1,35

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.


Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

Falconidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
4,24	4,87	4,76	1,50

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Faucon gerfaut (*Falco rusticolus*)

Falconidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
0,025	0	0,036	0,041


AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

Falconidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
2,02	1,77	1,32	0,605

PÉAH

La présence du faucon est due à deux sous-espèces: l'une, *tundrius*, niche au nord de la limite des arbres et migre vers le sud en survolant Lanaudière lors des migrations printanières et automnales; l'autre, reconstruite à partir d'individus de la sous-espèce *anatum*, se reproduit dans le sud du Québec, entre autres dans Lanaudière, et est aussi observée à l'hiver. Le Faucon pèlerin fait partie de la liste des espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière.

LES *TYRANNIDAE*

(les tyrans, les moucherolles, les piouis, …)



13 espèces de *Tyrannidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Tyran huppé (*Myiarchus crinitus*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,96	8,30	0,788	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Tyran de l’Ouest (*Tyrannus verticalis*)

Tyrannidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,002	0	0,220	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 16 mai 1986, l’espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Tyran tritri (*Tyrannus tyrannus*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,53	19,1	2,74	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Tyran à longue queue (*Tyrannus forticatus*)

Tyrannidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,023	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 avril 1992, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Moucherolle à côtés olive (*Contopus cooperi*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,150	0,559	0,128	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Pioui de l'Est (*Contopus virens*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,30	8,88	1,88	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Moucherolle à ventre jaune (*Empidomax flaviventris*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,175	0,926	0,188	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Moucherolle vert (*Empidomax virescens*)

Tyrannidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,019	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 23 juin 2006, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Moucherolle des aulnes (*Empidomax alnorum*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,63	9,57	0,486	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Moucherolle des saules (*Empidomax traillii*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,271	1,83	0,078	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Moucherolle tchébec (*Empidomax minimus*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,75	7,76	0,817	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Moucherolle phébi (*Sayornis phoebe*)

Tyrannidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
9,33	10,8	4,93	0,003



PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Moucherolle à ventre roux (*Sayornis saya*)

Tyrannidae

Espèce non-nicheuse




COP	COE	COA	COH
0,002	0	0,046	0



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 mai 1993, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *VIREONIDAE*

(les viréos)



6 espèces de *Vireonidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Viréo aux yeux blancs (*Vireo griseus*)

Vireonidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0,213	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 novembre 2016, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Viréo à gorge jaune (*Vireo flavifrons*)

Vireonidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 2002, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Viréo à tête bleue (*Vireo solitarius*)

Vireonidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,77	6,12	3,03	0,022


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Viréo de Philadelphie (*Vireo philadelphicus*)

Vireonidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,598	1,48	0,735	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Viréo mélodieux (*Vireo gilvus*)

Vireonidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,97	14,8	2,13	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Viréo aux yeux rouges (*Vireo olivaceus*)

Vireonidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,94	35,2	6,84	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *LANIIDAE*

(les pies-grièches)



2 espèces de *Laniidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Pie-grièche migratrice (*Lanius ludocicianus*)

Laniidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,027	0,106	0,004	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 18 mai 1958, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Pie-grièche boréale (*Lanius borealis*)

Laniidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,921	0,019	0,884	3,93

AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

LES *CORVIDAE*

(les geais, les corneilles, les corbeaux, …)



5 espèces de *Corvidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Mésangeai du Canada (*Perisoreus canadensis*)

Corvidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,564	0,684	1,66	1,51

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Geai bleu (*Cyanocitta cristata*)

Corvidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
31,4	34,4	49,5	35,5




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Pie d'Amérique (*Pica hudsonia*)

Corvidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,071	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 26 août 2017, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Corneille d'Amérique (*Corvus brachyrhynchos*)

Corvidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
54,3	47,9	44,0	31,1


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Grand Corbeau (*Corvus corax*)

Corvidae

Espèce nicheuse








COP	COE	COA	COH
14,7	11,7	18,6	17,5

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *PARIDAE*

(les mésanges)



3 espèces de *Paridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Mésange à tête noire (*Poecile atricapillus*)

Paridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
45,0	40,9	54,9	52,2

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Mésange à tête brune (*Poecile hudsonicus*)

Paridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,450	0,727	1,08	0,643


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Mésange bicolore (*Baeolophus bicolor*)

Paridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,007	0	0,028	0,098

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 30 décembre 1995, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *ALAUDIDAE*

(les alouettes)



2 espèces d'*Alaudidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Alaudidae

Espèce non-nicheuse





Aire de nidification
Aire de migration
Aire de résidence permanente
Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
0,045	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 6 mai 2018, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Alouette hausse-col (*Eremophila alpestris*)

Alaudidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
5,44	0,553	1,76	3,51

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *HIRUNDINIDAE*

(les hirondelles)



6 espèces d'*Hirundinidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,80	3,90	0,412	0



PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Hirondelle bicolore (*Tachycineta bicolor*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
21,7	27,6	2,23	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Hirondelle à ailes hérissées (*Stelgidopteryx serripennis*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,844	1,01	0M025	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Hirondelle noire (*Progne subis*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse



© Daniel Jauvin



COP	COE	COA	COH
0,334	2,01	0,124	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse







COP	COE	COA	COH
6,34	14,6	2,17	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Hirondelle à front blanc (*Petrochelidon pyrrhonota*)

Hirundinidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,41	2,63	0,270	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *REGULIDAE*

(les roitelets)



2 espèces de *Regulidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Roitelet à couronne rubis (*Corthylio calendula*)

Regulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,81	4,07	6M72	0,006

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Roitelet à couronne dorée (*Regulus satrapa*)

Regulidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
4,05	4,96	6,81	1,34



PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

LES *BOMBYCILLIDAE*

(les jaseurs)



2 espèces de *Bombycillidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

Bombycillidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,07	0,006	0,905	2,30

AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Jaseur d'Amérique (*Bombycilla cedrorum*)


Espèce

Bombycillidae

nicheuse




COP	COE	COA	COH
2,38	32,4	9,02	0,605



PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *SITTIDAE*

(les sittelles)



2 espèces de *Sittidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Sittelle à poitrine rousse (*Sitta canadensis*)

Sittidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
12,9	15,4	20,0	15,5

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.


Sittelle à poitrine blanche (*Sitta carolinensis*)

Sittidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
16,0	10,6	20,7	21,2



PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *CERTHIDAE*

(les grimpereaux)



1 espèce de *Certhidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Grimpereau brun (*Certhia americana*)

Certhidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
3,74	1,69	3,46	2,92

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *POLIOPTILIDAE*

(les gobemoucherons)



1 espèce de *Polioptilidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Gobemoucheron gris-bleu (*Polioptila caerulea*)

Polioptilidae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,03	0	0,362	0,044

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 13 mai 1994, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *TROGLODYTIDAE*

(les troglodytes)



5 espèces de *Troglodytidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Troglodyte de Caroline (*Thjryotorus ludovicianus*)

Troglodytidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,050	0,012	0,163	0,408




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 juin 1989, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Troglodyte familier (*Troglodytes aedon*)

Troglodytidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,35	3,94	0,682	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Troglodyte des forêts (*Troglodytes hiemalis*)

Troglodytidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,69	9,01	1,18	0,041

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Troglodyte à bec court (*Cistothorus stellaris*)

Troglodytidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,005	0,025	0,004	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 16 mai 1964, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Troglodyte des marais (*Cistothorus palustris*)

Troglodytidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,31	6,09	1,41	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *MIMIDAE*

(les moqueurs)



3 espèces de *Mimidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Moqueur chat (*Dumetella carolinensis*)

Mimidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,93	12,2	5,57	0,003

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Moqueur roux (*Toxostoma rufum*)

Mimidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
2,97	3,43	0,628	0,358



PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Moqueur polyglotte (*Mimus polyglottos*)

Mimidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,387	1,08	0,405	0,215

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 13 mai 1972, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *STURNIDAE*

(l'étourneau)



1 espèce de *Sturnidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Sturnidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
38,1	30,7	20,4	21,6

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

LES *TURDIDAE*

(les merles, les merlebleus, les grives, les solitaires)



10 espèces de *Turdidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Merlebleu de l'Est (*Sialia sialis*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,18	4,08	1,51	0,041

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Solitaire de Townsend (*Myadestes townsendi*)

Turdidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,007	0,117


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 26 décembre 2021, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Grive fauve (*Catharus fuscescens*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,76	14,8	0,614	0,022

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Grive à joues grises (*Catharus minimus*)

Turdidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,077	0,025	0,025	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Grive de Bicknell (*Catharus bicknelli*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,118	0	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Grive à dos olive (*Catharus ustulatus*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,56	7,73	1,28	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Grive solitaire (*Catharus guttatus*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,86	14,2	2,79	0,047


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Grive des bois (*Hylocichla mustelina*)

Turdidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,816	1,98	0,064	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Merle d'Amérique (*Turdus migratorius*)

Turdidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
52,1	59,5	25,1	3,39



PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Grive à collier (*Ixoreus naevius*)

Turdidae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0,007	0	0,241	0,222

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 9 février 2001, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *PASSERIDAE*

(les moineaux)



2 espèces de *Passeridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Passeridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
14,3	10,5	10,616,9	


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Passeridae

Espèce non-nicheuse






COP	COE	COA	COH
0	0	0,699	0,108

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 20 novembre 2021, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *MOTACILLIDAE*

(les pipits)



1 espèce de *Motacillidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Pipit d'Amérique (*Anthus rubescens*)

Motacillidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,500	0,012	1,76	0

PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

LES *FRINGILLIDAE*

(les roselins, les chardonnerets, les tarins, les gros-becs, …)



9 espèces de *Fringillidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Gros-bec errant (*Coccothraustes vespertinus*)

Fringillidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,28	2,01	3,45	5,06


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Durbec des sapins (*Pinicola enucleator*)

Fringillidae

Espèce non-nicheuse








COP	COE	COA	COH
1,04	0,019	1,96	7,62

AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.


Roselin familier (*Haemorhous mexicanus*)

Fringillidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
7,38	5,82	6,87	7,97




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Roselin pourpré (*Haemorhous purpureus*)

Fringillidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
10,0	12,7	7,06	3,66

PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Sizerin flammé (*Acanthis flammea*)

Fringillidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
7,69	0,006	2,55	14,6


AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

Fringillidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,125	0,137	0,462	0,681

PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*)


Fringillidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,680	0,547	1,61	3,07






PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Tarin des pins (*Spinus pinus*)

Fringillidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
7,70	2,41	4,24	5,58


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Chardonneret jaune (*Spinus tristis*)

Fringillidae

Espèce nicheuse





- Aire de nidification
- Aire de migration
- Aire de résidence permanente
- Aire d'hivernage


COP	COE	COA	COH
34,6	50,9	36,7	23,0

PÉAH

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

LES *CALCARIIDAE*

(les plectrophanes)



2 espèces de *Calcariidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles

Plectrophane lapon (*Calcarius lapponicus*)


Calcariidae

Espèce non-nicheuse



© Daniel Jauvin

COP	COE	COA	COH
0,102	0	0,178	0,785



AHP


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.


Plectrophane des neiges (*Plectrophenax nivalis*)

Calcariidae

Espèce non-nicheuse







COP	COE	COA	COH
3,39	0	3,45	12,3

AHP

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.

LES *PASSERELLIDAE*

(les bruants, les juncos, les tohis, …)



20 espèces de *Passerellidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Bruant à joues marron (*Chondestes grammacus*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0	0,003




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 10 décembre 1997, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bruant noir et blanc (*Calamospiza melanocoryx*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 26 avril 1959, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bruant familier (*Spizella passerina*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
15,9	29,3	6,97	0,066

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bruant des plaines (*Spizella pallida*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,030	0,305	0,018	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bruant des champs (*Spizella pusilla*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,173	0,385	0,053	0,013


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bruant fauve (*Passerella iliaca*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,23	0,106	1,21	0,070


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bruant hudsonien (*Spizelloides arborea*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
9,15	0	4,53	12,6

AHP L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été.


Junco ardoisé (*Junco hyermalis*)

Passerellidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
22,0	3,36	21,9	24,8




PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Bruant à couronne blanche (*Zonotrichia leucophrys*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,89	0,050	5,75	0,196


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Bruant à couronne dorée (*Zonotrichia atricapilla*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,011	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 1er novembre 2014, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Bruant à face noire (*Zonotrichia querula*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse



© Alain Sylvain



COP	COE	COA	COH
0,055	0	0	0,529


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 8 mai 2010, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bruant à gorge blanche (*Zonotrichia albicollis*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
17,5	25,1	16,2	1,79


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bruant vespéral (*Pooecetes gramineus*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,63	2,45	0,227	0,013

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Bruant de Nelson (*Ammospiza nelsoni*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0,056	0,004	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 2 octobre 1950, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Bruant des prés (*Passerculus sandwichensis*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,24	7,48	0,909	0,016

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Bruant chanteur (*Melospiza melodia*)

Passerellidae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
47,0	58,8	25,2	1,72



PÉAH


Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cependant, la population comporte aussi une portion significative de *nicheurs résidants* de sorte que la présence de l'espèce est aussi prévisible à l'hiver, mais moins importante.

Bruant de Lincoln (*Melospiza lincolnii*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,321	0,342	0,682	0,003


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Bruant des marais (*Melospiza georgiana*)

Passerellidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
8,42	18,2	4,55	0,028

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Tohi tacheté (*Pipilo maculatus*)

Espèce

Passerellidae

non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 28 décembre 2024, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Tohi à flancs roux (*Pipilo erythrophyhalmus*)

Passerellidae

Espèce non-nicheuse




COP	COE	COA	COH
0,064	0,056	0,053	0,123



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 juin 1983, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *ICTERIIDAE*

(l'ictérie)



1 espèce d'*Icteriidae*
a été notée dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026

Retour à la liste des familles


Ictérie polyglotte (*Icteria virens*)

Icteriidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	00,039	0	



IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 novembre 2022, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

LES *ICTERIDAE*

(les goglus, les sturnelles, les carouges, les quiscales, les vachers, …)



10 espèces d'*Icteridae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Carouge à tête jaune (*Xanthocephalus xantocephalus*)

Icteridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0,006	0,039	0,013


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 14 juillet 1988, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Goglu des prés (*Dolichonyx oryzivorus*)

Icteridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,12	6,94	0,266	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Sturnelle des prés (*Sturnella magna*)

Icteridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,95	1,78	0,185	0,019

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Sturnelle de l'Ouest (*Sturnella neglecta*)

Icteridae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 mai 2021, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Oriole des vergers (*Icterus spurius*)

Icteridae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,007	0,006	0	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 25 mai 1966, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Oriole de Baltimore (*Icterus galbula*)

Icteridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
6,75	11,6	1,10	0,019

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Carouge à épaulettes (*Agelaius phoeniceus*)

Icteridae

Espèce nicheuse





Aire de nidification
Aire de migration
Aire de résidence permanente
Aire d'hivernage

COP	COE	COA	COH
46,6	43,3	10,4	1,23


PÉA Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Vacher à tête brune (*Molothrus ater*)

Icteridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
12,2	7,81	1,04	0,722


PÉA

Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Quiscale rouilleux (*Euphagus carolinus*)


Icteridae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,82	0,435	1,81	0,165



PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Quiscale bronzé (*Quiscalus quiscula*)

Icteridae

Espèce nicheuse



COP	COE	COA	COH
42,7	42,5	8,09	0,535




PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *PARULIDAE*

(les parulines)



30 espèces de *Parulidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Paruline couronnée (*Seiurus aurocapilla*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
6,62	17,6	0,841	0,019


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline des ruisseaux (*Parkesia noveboracensis*)

Parulidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
1,99	2,96	0,259	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à ailes dorées (*Vermivora chrysoptera*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,002	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 5 juillet 1978, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Paruline noir et blanc (*Mniotilta varia*)

Espèce

Parulidae

nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,16	10,8	2,61	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline orangée (*Protonotaria citrea*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 17 juin 1977, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Paruline obscure (*Leiothlypis peregrina*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,01	1,25	1,55	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline verdâtre (*Leiothlypis celata*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,084	0,006	0,135	0


PA L'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible deux saisons, au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver.

Paruline à joues grises (*Leiothlypis ruficapilla*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,58	8,90	3,11	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à gorge grise (*Oporornis agilis*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0,012	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 4 juin 2002, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Paruline triste (*Geothlypis philadelphia*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,719	5,16	0,192	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline masquée (*Geothlypis trichas*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
7,47	29,7	4,24	0,003

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Paruline à capuchon (*Setophaga citrina*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0,002	0,006	0	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 9 juin 2004, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Paruline flamboyante (*Setophaga ruticella*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,10	12,2	2,13	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline tigrée (*Setophaga tigrina*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,21	0,665	1,04	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à collier (*Setophaga americana*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,11	9,22	1,73	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à tête cendrée (*Setophaga magnolia*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
4,35	11,9	3,37	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à poitrine baie (*Setophaga castanea*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,29	1,45	1,24	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à gorge orangée (*Setophaga fusca*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
2,83	6,18	1,42	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline jaune (*Setophaga petechia*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
9,41	25,2	2,40	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à flancs marron (*Setophaga pensylvanica*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,25	16,0	1,74	0

PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


Paruline rayée (*Setophaga striata*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
1,54	0,820	0,717	0,006



PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline bleue (*Setophaga caerulescens*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
3,85	10,2	1,89	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à couronne rousse (*Setophaga palmarum*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,32	0,441	0,728	0,006


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline des pins (*Setophaga pinus*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,96	2,13	0,401	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à croupion jaune (*Setophaga coronata*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
11,4	10,1	12,2	0,025

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à gorge jaune (*Setophaga dominica*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,703	0,355

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 23 octobre 1993, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.


Paruline des prés (*Setophaga discolor*)

Parulidae

Espèce non-nicheuse



COP	COE	COA	COH
0	0	0,007	0




IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 22 octobre 2000, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Paruline à gorge noire (*Setophaga virens*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,07	9,34	2M87	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline du Canada (*Cardellina canadensis*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,750	2,41	0,557	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Paruline à calotte noire (*Cardellina pusilla*)

Parulidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,730	0,367	0,362	0

PÉA

L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

LES *CARDINALIDAE*

(les cardinaux, les pirangas, les passerins, …)



7 espèces de *Cardinalidae*
ont été notées dans Lanaudière avant le 1er janvier 2026


Retour à la liste des familles

Piranga écarlate (*Oiranga olivacea*)

Cardinalidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,921	1,95	0,298	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Piranga à tête rouge (*Piranga ludoviciana*)

Cardinalidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0,092	0,161


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 21 novembre 2022, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Cardinal rouge (*Cardinalis cardinalis*)

Cardinalidae

Espèce nicheuse






COP	COE	COA	COH
20,0	15,1	13,0	15,6


PÉAH Dans Lanaudière, l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants* dont la présence est prévisible en toutes saisons.

Cardinal à poitrine rose (*Pheucticus ludovicianus*)

Cardinalidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
5,03	8,34	1,79	0


PÉA L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Guiraca bleu (*Passerina caerulea*)

Cardinalidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0	0	0	0


IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 17 juin 1982, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.

Passerin indigo (*Passerina cyanea*)

Cardinalidae

Espèce nicheuse





COP	COE	COA	COH
1,03	6,14	0,490	0

PÉA


L'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrateurs* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible trois saisons, au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Dickcissel d'Amérique (*Spiza americana*)

Cardinalidae

Espèce non-nicheuse





COP	COE	COA	COH
0,011	0	0	0

IMP Notée pour la première fois dans Lanaudière le 15 août 1981, l'espèce est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en toutes saisons.